

Langzeitprophylaxe der Hepatischen Enzephalopathie (HE)

Das HE-Risiko kennt keine Pause – auch nicht zu Hause



XIFAXAN® 550 mg bei HE – einfache Einnahme: 2x täglich 1 Tablette¹

- **Empfohlene Dosis:** 550 mg 2x täglich (morgens & abends)^{1,*}
- **Einnahme:** unabhängig von den Mahlzeiten – mit einem Glas Wasser¹
- **Therapiestart:** direkt nach der HE-Diagnose, um weiteren Episoden und schweren Folgen vorzubeugen^{2-7,§,&}
- **Empfohlene Behandlungsdauer:** Nutzen Sie XIFAXAN® 550 mg zur konsequenten prophylaktischen Langzeittherapie.^{1-4,7,&}
- **Dosisanpassung:** bei älteren Patienten und Patienten mit Nieren- oder Leberinsuffizienz **nicht erforderlich**¹

Besser langfristiger und wirtschaftlicher therapieren mit der N3 98er Packung.

Produkt	Packungsgröße	Größe	PZN
XIFAXAN® 550 mg	N1	1 Packung mit 28 Tabletten	02834212
XIFAXAN® 550 mg	N3	1 Packung mit 98 Tabletten	14041451

* Keine Dosisanpassung bei älteren Patienten und Patienten mit Nieren- oder Leberinsuffizienz erforderlich. / § Bass NM, et al.: 91% der Patienten in beiden Behandlungsarmen erhielten als Begleitmedikation Lactulose. / & Mullen KD, et al.: 89,8% der Patienten erhielten als Begleitmedikation Lactulose.

1. XIFAXAN® 550 mg Fachinformation, aktueller Stand. / 2. Sanyal A, et al. Aliment Pharmacol Ther 2011; 34(8): 853–61. / 3. Vilstrup H, et al. J Hepatol 2014; 61(3): 642–59. / 4. Chronic Liver Disease Foundation. Hepatic Encephalopathy Update: Prophylactic Therapy to Prevent Hepatic Encephalopathy. August 2012. / 5. Romero-Gómez M. Expert Opin Pharmacother 2010; 11(8): 1317–27. / 6. Bass NM, et al. N Engl J Med 2010; 362(12): 1071–81. / 7. Mullen KD, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12(8): 1390–7.

XIFAXAN® 550 mg Filmtabletten. Zusammensetzung: Rifaximin 550 mg. Sonstige Bestandteile: Tablettenkern: Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz, Glyceroldistearat (Ph. Eur.), Hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Mikrokristalline Cellulose, Filmüberzug Opadry OY-S-34907: Hypromellose, Titandioxid (E171), Natriumedetat (Ph. Eur.), Propylenglycol, Eisen(III)-oxid (E172). **Anwendungsgebiete:** Xifaxan 550 mg Filmtabletten sind zur Verminderung des Wiederauftretens von Episoden einer manifesten hepatischen Enzephalopathie bei Patienten ≥ 18 Jahren indiziert. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Rifaximin, Rifamycin-Derivate oder einen der sonstigen Bestandteile, intestinale Obstruktion. **Nebenwirkungen:** Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: Anämie, Thrombozytopenie. Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Aszites, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch, Bauchschmerzen, Ösophagusvarizenblutung, Mundtrockenheit, Magenbeschwerden, abdominale Aufblähung, Diarrhö, Obstipation. Erkrankungen des Immunsystems: Anaphylaktische Reaktionen, Angioödem, Hypersensitivität. Infektionen und parasitäre Erkrankungen: Clostridien-Infektion, Harnwegsinfektion, Candidiasis, Pneumonie, Zellulitis, Infektionen der oberen Atemwege, Rhinitis. Stoffwechsel und Ernährungsstörungen: Anorexie, Hyperkalämie, Dehydratation. Psychiatrische Erkrankungen: Depression, Verwirrheitszustand, Angstgefühl, Hypersomnie, Insomnie. Erkrankungen des Nervensystems: Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, Amnesie, Konvulsion, Aufmerksamkeitsstörungen, Hypästhesie, Gedächtnisstörungen. Gefäßerkrankungen: Hitzewallungen, Hypertonie, Hypotonie, Präsynkope, Synkope. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums: Dyspnoe, Pleuraerguss, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. Leber- und Gallenerkrankungen: Leberfunktionstests verändert. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Ausschläge, Pruritus, Dermatitis, Ekzem. Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen: Muskelspasmen, Arthralgie, Myalgie, Rückenschmerz. Erkrankungen der Nieren und Harnwege: Dysurie, Pollakisurie, Proteinurie. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Ödem peripher, Ödem, Pyrexie, Asthenie. Untersuchungen: INR-Wert verändert. Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen: Sturz, Kontusionen, Schmerzen während/nach Eingriffen. **Handelsformen:** Blisterpackungen aus PVC-PE-PVDC/Aluminiumfolie in Faltschachteln mit 28 oder 98 Filmtabletten. Verschreibungspflichtig. Stand: 04/2021

Produkt unter Lizenz von Alfasigma S.p.A. XIFAXAN ist eine eingetragene Marke der Alfasigma Unternehmensgruppe, lizenziert an die Norgine-Unternehmensgruppe. NORGINE und das Norgine-Siegel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.

Norgine GmbH, Im Westpark 14, 35435 Wettenberg, Internet: www.norgine.de, e-mail: info@norgine.de



Xifaxan®550mg
Rifaximin- α

Reduktion wiederkehrender
HE-Episoden¹